

## 2016 HASADA BAKIŞ

2016 hasadı bağlarımızın 10. yaşını kutladığımız eşsiz bir sezon oldu.

01.01.2016 itibari ile sezonda metrekareye 140 mm yağış düştü. Sulama yapmadığımızdan bağ köklerinin uzamış ve toprağın derinliklerindeki sulara ulaşabiliyor olması sayesinde daha önceki hasatlar ile karşılaştığında oldukça düşük olan bu yağış miktarına rağmen bağlarda herhangi bir su stresi yaşanmadı.

Yağış azlığının yanı sıra normalinden çok daha sıcak geçen sezonda hasat diğer senelerden yaklaşık 10 gün kadar erken başladı. Tüm bunlara rağmen aromatik yapısı güçlü, konsantre, dengeli üzümleri ile 2016 hasadı iyi senelerden biri olarak yerini aldı.

2016 senesi *botrytis cinerea* için çok uygun bir seneydi. Bağlarımızda sistemik olmayan yani, yağmur suyu ile yıkanıp giden ilaçlar kullandığımızdan ve *botrytis cinerea*'ya (asil küf) karşı ise herhangi bir ilaçlama yapmadığımızdan hasada 1-2 hafta kala bağlarda *botrytis* oluşumunu gözlemledik. Danışman önologumuz Dr. Michel Salgues'in yönlendirmeleriyle belirli bir Sauvignon Blanc parselini ayırarak geç hasada bıraktık. Burada amaç salkımın büyük bir oranda *botrytis* ile kaplanmasına süre tanımak ve tanede şeker oranını arttırıp güzel bir *Botrytis* tatlı şarabı daha üretmekti. Beklettiğimiz süre içerisinde bulunduğumuz teruarın sağladığı imkanlarla geç hasada bıraktığımız salkımlar zarar görmeden hasat edildi.

Her ne kadar sezon yağışsız ve sıcak geçmiş olsa da, 2016 senesi üzüm konsantrasyonu, asit-şeker dengesi ve aromatik yapısı ile bize çok güzel şaraplar sundu.